

Cálculo de autovalores de matrices de orden n con elementos reales por el algoritmo QR.

Definición: Dos matrices A y B son semejantes si existe una matriz H , no singular, tal que $B = H^{-1}AH$. Esto se denota como $A \cong B$

Propiedades de la semejanza:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. $A \cong A$ | Propiedad reflexiva |
| 2. Si $A \cong B$ entonces $B \cong A$ | Propiedad simétrica |
| 3. Si $A \cong B$ y $B \cong C$ entonces $A \cong C$ | Propiedad transitiva |

Resultado importante:

Dos matrices semejantes tienen los mismos autovalores

Demostración: Sea $A \cong B$. Por lo tanto $B = H^{-1}AH$, para H , no singular. Si λ es un autovalor de A , entonces $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$. En consecuencia $BH^{-1}x = H^{-1}AHH^{-1}x = H^{-1}Ax = H^{-1}\lambda x = \lambda H^{-1}x$. Por lo tanto λ es "también" un autovalor de B , asociado al autovector $H^{-1}x$.

En este apéndice toda matriz denotada Q , se asume que es una matriz ortogonal (tal que $Q^{-1} = Q^T$).

El algoritmo QR presentado aquí, utiliza matrices ortogonales. Si $B = Q^T A Q$ o $A = Q^T B Q$, se dice que A y B , son semejantes por una transformación ortogonal.

Las transformaciones ortogonales semejantes del tipo $Q^T A Q$, en donde Q es una matriz ortogonal, son "estables" en el sentido definido por Wilkinson en "The Algebraic eigenvalue problem [1965]". En su estudio señaló que en la presencia de error por redondeo, los autovalores de la matriz "calculada" $Q^T A Q$ son los autovalores "exactos" de una matriz $A + \varepsilon_{n,n}$, o sea A con entradas ligeramente perturbadas, donde los elementos de la matriz $\varepsilon_{n,n}$ son "pequeños" en "cierta" medida.

Un algoritmo estable como el QR , que se describirá a continuación, no garantiza una conveniente aproximación a los resultados en todos los casos, ya que algunos, si no todos, los autovalores de la matriz A pueden ser mal condicionados en el sentido de que aún una "ligera" perturbación en A puede producir "grandes" perturbaciones en ellos. En tales casos aún un algoritmo estable puede no "resolver" convenientemente el problema.

Si $A = QR$ y $A_1 = RQ$, entonces $A \cong A_1$. Es decir que QR y RQ tienen los mismos autovalores.

Demostración: $Q^T QRQ = IRQ = RQ$. Por lo tanto $RQ \cong QR$

Algoritmo QR

Originalmente el algoritmo QR , comenzaba con una descomposición $A = QR$, utilizando rotaciones ortogonales de Givens como se sugiere en este texto o transformaciones ortogonales de Householder. Luego se calculaba un nuevo producto RQ , obteniendo así una nueva matriz semejante a $A = RQ$, con los mismos autovalores

Shifted QR (Algoritmo QR con translación)

Resultado importante

Si $A - \alpha I = QR$, $\alpha \in R$ (Descomposición QR de $A - \alpha I$)

Entonces $A \cong RQ + \alpha I$ ($RQ + \alpha I$ tiene los mismos autovalores que A)

Demostración:

Como QR es la descomposición de $A - \alpha I$, tenemos que $Q^T (A - \alpha I) Q = RQ$, de donde $Q^T A Q - Q^T \alpha I Q = RQ$. Luego $Q^T A Q - \alpha I = RQ$. En consecuencia $Q^T A Q = RQ + \alpha I$. Concluyéndose que $A \cong RQ + \alpha I$.

El algoritmo QR trasladado (shifted QR), procede así:

Escogiendo un número α conveniente, a veces $a_{n,n}$, elemento en la esquina inferior derecha de A , se efectúa la descomposición QR de $A - \alpha I$, luego se calcula $A_1 = RQ + \alpha I$. Se obtiene así A_1 con los mismos autovalores que A . Efectuando una nueva descomposición QR previa translación $A_1 - \alpha I = QR$, se obtiene $A_2 = RQ + \alpha I$. Se va generando de esta manera una sucesión de matrices A_1, A_2, A_3, \dots . Con la estrategia "apropiada", los elementos debajo de la diagonal principal se van acercando a cero, tendiendo a aparecer una matriz triangular superior por bloques, algunos de orden 1 (autovalores reales) y otros de orden superior, correspondientes a autovalores complejos conjugados.

Si la matriz A tiene autovalores reales, como es el caso de las matrices simétricas, la secuencia tiende a una matriz triangular superior con los autovalores en la diagonal.

Se ha probado la convergencia del algoritmo QR para matrices simétricas y para matrices con autovalores "no defectuosos", en el sentido de que un autovalor de multiplicidad k , tiene k autovectores independientes.

No existe una prueba general de la convergencia del algoritmo QR en el caso de autovalores defectuosos.

Sin embargo MatLab calcula los autovalores con variaciones del algoritmo QR , señalando aquellos casos donde la citada convergencia presenta problemas.

Busque en la Web: The MathWorks, Inc., *Numerical Computing with MATLAB*,
Cleve Moler
<http://www.mathworks.com/moler>

Allí hallará aplicaciones no sólo de la descomposición QR si no también de la descomposición en valor singular SVD y mucho más con su conveniente bibliografía.